

**sexmoor**

Société d'exploitation de molécules originales

**Animaux de rente****Paralysie post vêlage - vache couchée****Syndrôme de la vache couchée (vache laitière)**

<b>Période :</b>	janvier	<b>Région :</b>	Centre (42)
------------------	---------	-----------------	-------------

**Identification**

<b>Race :</b>	Montbéliard	<b>Age :</b>	6 ans
<b>Sexe :</b>	Femelle	<b>Poids :</b>	750 kg
<b>Destination :</b>	Production laitière		

**Pathologie**

<b>Anamnèse :</b>	Décubitus de type primaire d'origine traumatique après un vêlage dystocique. Relevé impossible.		
<b>Symptômes :</b>	1) sacrum affaissé entre les deux angles de l'ilium, 2) à la palpation transrectale, on sent un sacrum incliné dans le bassin.		
<b>Diagnostic différentiel :</b>	Les symptômes et le résultat des explorations cliniques indiquent une luxation bilatérale sacro-iliaque avec possibilité de lésion des nerfs obturateurs.		
<b>Pronostic :</b>	Réservé.		

**Traitement antérieur et résultats**

aucun, appel immédiat		
-----------------------	--	--

**Traitement instauré**

Traitement	Posologie	Durée
ara arthrite ND	10 ml en IM	J0, J2, J4, J8

**Evolution**

A J3, la vache s'est relevée spontanément. La démarche reste hésitante avec les membres raides et en abductions.  
 A J8, l'équilibre et la mobilité de l'animal sont complètement restitués.

**Commentaires du vétérinaire ou de l'éleveur**

Guérison rapide et sans séquelles.

La difficulté de poser un diagnostic précis est liée aux diverses étiologies possibles (traumatique, endotoxique, métaboliques), aux multiples localisations lésionnelles possibles et au degré de gravité de l'atteinte. Un diagnostic différentiel précis est indispensable pour appliquer un traitement spécifique et établir un pronostic réaliste. Dans le cadre du traumatisme ci-dessus, l'usage des AINS est justifié, mais doit être limité dans le temps vu le risque d'ulcères abomasaux.

L'ara arthrite, par ses actions différentes sur les étapes du Mode de l'inflammation, n'entraîne aucune toxicité hépatique, rénale, musculaire, tant à court qu'à très long terme. Son usage ne doit donc pas être limité dans le temps.

Avantage supplémentaire : l'absence de délai d'attente en viande et lait.